



CHEMOTECNICA

DIVISIÓN SANIDAD AMBIENTAL

Control de plagas y bioseguridad
Más seguridad, más eficiencia, más rentabilidad

Todo para el manejo profesional de plagas

- ▶ Urbanas
- ▶ Industriales
- ▶ Pecuarias
- ▶ Vectores de Enfermedad

Índice

SALUD PÚBLICA	02
HIGIENE RURAL	09
USO PROFESIONAL	16
CONTROL DE ROEDORES	27
GRANOS ALMACENADOS	36
ACCESORIOS	43

Salud Pública

Bolatte®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN:
Beta-Cipermetrina (Asimetrina) 5 %.

FORMULACIÓN: Pote Fumígeno.

PRESENTACIÓN: Pote: 120 gramos.
(Caja madre: 24 potes).

DOSIS: 1 pote cada 200 m³.



Depe®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN: Permetrina High Cis 10 %.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable.

PRESENTACIÓN: Envase: 1 litro (Caja: 12 unid.).

DOSIS: Para Rastreros: de 50 a 75 ml / 5 lt de Agua.*

Para Voladores: de 25 a 50 ml / 5 lt de Agua.*

Para Tratamientos Espaciales: 70 ml / 1 ha.

(*) Dosis recomendadas para tratar 100 m²



Dragón Max®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN: Permetrina 10 % - Piriproxifen 2 %.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable.

PRESENTACIÓN: Envase: 1 litro (Caja: 12 unid.).

DOSIS: Para Rastreros: de 50 a 75 ml / 5 lt de Agua.*

Para Voladores: de 25 a 50 ml / 5 lt de Agua.*

Para Tratamientos Espaciales: 100 ml / 1 ha.

(*) Dosis recomendadas para tratar 100 m²



Introban®

LARVICIDA



COMPOSICIÓN: Bacillus thuringiensis
variedad israeliensis 1.200 UTI.

FORMULACIÓN: Suspensión Acuosa

PRESENTACIÓN: Bidón: 10 L (Caja: 2 unid.).

DOSIS: Cada 1,5 ml a 3 ml / 10 m²
cada 14 días.



Introbán® Anillos


LARVICIDA

COMPOSICIÓN: Bacillus thuringiensis
variedad israeliensis 7.000 UTI.

FORMULACIÓN: Anillo de liberación lenta.

PRESENTACIÓN: Blister: 20 anillos de
13 gramos (Caja: 5 unid.).

DOSIS: Agua con contenido orgánico bajo
1 anillo y alto contenido orgánico 2 anillos,
para 9 m² cada 30 días.



Sipertrin®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN: Beta-Cipermetrina (Asimetrina) 5 %.

FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (Floable).

PRESENTACIÓN: Envase: 1 litro (Caja: 12 unid.).

DOSIS: Para Rastreros: de 40 a 60 ml / lt de Agua*

Para Voladores: de 30 a 40 ml / 5 lt de Agua*

Para Vectores: 100 ml / 5 lt de Agua*

(*) Dosis recomendadas para tratar 100 m²



Higiene Rural

Apolo®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN: Bifentrin 8 % - Imidacloprid 10 %.

FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (Floable).

PRESENTACIÓN: Envase: 1 litro (Caja: 12 unid.).

DOSIS: Altas infestaciones: 30 ml / 5 lt de Agua*
Bajas infestaciones: 15 ml / 5 lt de Agua*

(*) Dosis recomendadas para tratar 100 m²



Asi Net®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN: Beta Cipermetrina 5 %
Butóxido de Piperonilo (PBO) 15 %.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable.

PRESENTACIÓN: Envase: 1 litro (Caja: 12 unid.).

DOSIS: Para Rastreros: de 50 a 75 ml / 5 lt de Agua*
Para Voladores: de 25 a 50 ml / 5 lt de Agua*

(*) Dosis recomendadas para tratar 100 m²



Betakrom® 10WP

**INSECTICIDA
MOSQUICIDA**




COMPOSICIÓN: Azametifos 10 %

FORMULACIÓN: Polvo Mojable.

PRESENTACIÓN: Envase: 250 gramos. Balde: 5 kilos.

DOSIS: 250 grs / 200 ml de Agua (pintura)
500 grs / 4 lt de Agua (pulv.).*

(*) Dosis recomendadas para tratar 200 m²



Dragón®

IGR-LARVICIDA



COMPOSICIÓN: Piriproxifen 2 %.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable.

PRESENTACIÓN: Envase: 250 cc.

DOSIS: De 50 a 75 ml / 5 lt de Agua*
Para Tratamientos Especiales: cada 100 ml / 1 ha.

(*) Dosis recomendadas para tratar 100 m²





Erradic Fly[®]

Trampa ecológica
para moscas



CLASIFICACIÓN: Trampa ecológica con atractivos alimentarios (kairomonas).

ACCIÓN: Físico-Mecánica (sin insecticidas), captura viva.

PRESENTACIÓN: Kit de 12 unidades completas (Balde trampa perforado de 10 litros, 8 conos plásticos "one way" y 300 gr de cebo en polvo atractivo).

Trampa ecológica de alta eficiencia y eficacia para reducir poblaciones de moscas adultas y monitorear los niveles de densidad poblacional. Ideal para programas de manejo integrado de plagas.

Uso Profesional

Chemofog®

INSECTICIDA
FOGGER



COMPOSICIÓN: Permetrina high cis 1 %
Tetrametrina 0,05 % - Butóxido de piperonilo 2,5 %.

FORMULACIÓN: Aerosol de descarga total.

PRESENTACIÓN: Envase: 12 x 440 ml / 212 gr.

DOSIS: 1 aerosol cada 200 m³.



Chemonil®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN: Fipronil 2 %.

FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada.

PRESENTACIÓN: Envase: 1 litro (Caja: 12 unid.).

DOSIS: De 50 a 75 ml / 5 lt de Agua*

(*) Dosis recomendada para tratar 100 m²



Chemotrina®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN:

Praletrina 2 % - Butóxido de Piperonilo 10 %.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable.

PRESENTACIÓN: Envase: 1 litro (Caja: 12 unid.).

DOSIS: De 50 a 65 ml / 5 lt de Agua*

(*) Dosis recomendada para tratar 100 m²



Chemoxane® F

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN: Cipermetrina 1,3 gr.

FORMULACIÓN: Componentes fumígenos e inertes c.s.p. 100,0 gr.

PRESENTACIÓN: Pastillas: 50 gr. Estuche: 1 pastilla.

DOSIS: 1 Pastilla cada 50 metros cúbicos.
De amplio espectro de acción.



Demoledor®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN:

Betacipermetrina 5 % - Lufenuron 2 %.

FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (Floable).

PRESENTACIÓN: Envase: 1 litro (Caja: 12 unid.).

DOSIS: Para Rastreros: 50 ml / 5 lt de Agua*
Para Voladores: 75 ml / 5 lt de Agua*

(*) Dosis recomendadas para tratar 100 m²



Perfeno®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN: Propoxur 20 %.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable.

PRESENTACIÓN: Envase: 1 litro (Caja: 12 unid.).

DOSIS: De 125 ml a 250 ml / 5 lt de Agua*

(*) Dosis recomendada para tratar 100 m²



Platinum[®]

INSECTICIDA
CUCARACHICIDA

COMPOSICIÓN: Hidrametilnona 2,15 %.


FORMULACIÓN: Cebo en Gel.

PRESENTACIÓN:

Estuche con jeringa de 30 gramos.

DOSIS: Para *Blatella Germanica*: 0.25 gr a 0.5 gr / m²

Para *Periplaneta Americana*: 0.5 a 1 gr / m²



Proteginal®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN: Cipermetrina 20 %.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable.

PRESENTACIÓN: Envase: 1 litro (Caja: 12 unid.).
Bidón: 5 litros (Caja: 4 unid.).

DOSIS: Para Rastreros: De 50 a 75 ml / 5 lt de Agua*
Para Voladores: De 40 a 50 ml / 5 lt de Agua*

(*) Dosis recomendadas para tratar 100 m²



Quorum Gel®

INSECTICIDA
CUCARACHICIDA



COMPOSICIÓN: Fipronil 0,05 %.

FORMULACIÓN: Cebo en Gel.

PRESENTACIÓN: Jeringa de 30 gramos

DOSIS: Para *Blatella Germánica*: 0.25 gr a
0.5 gr / m² - Para *Periplaneta Americana*:
0.5 a 1.0 gr / m²



Quorum SC®

INSECTICIDA



COMPOSICIÓN: Fipronil 20 %.

FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (Floable).

PRESENTACIÓN: Envase: 50 CC. y 250 CC.

DOSIS: 5 ml a 7,5 ml / 5 lt de Agua*. Las dosis mas elevadas corresponden a altas infestaciones y/o aplicaciones sobre superficies porosas.

(*) Dosis recomendadas para tratar 100 m²



Control de Roedores

Kaput BR[®]



COMPOSICIÓN: Brodifacoum 0,005%

FORMULACIÓN: Bloques parafínicos de 5 y 20 gramos.

PRESENTACIÓN: Caja de 6 potes x 1 kilo / Balde de 10 kilos.

DOSIS: En Rata (5 gr) 8 a 32 bloques / (20 gr) 2 a 8 bloques.
En Ratón (5 gr) 2 a 4 bloques / (20 gr) 1 bloque

Acción monodósica. Excelente palatabilidad.

Kaput D®



COMPOSICIÓN: Difenacoum 0,005 g

FORMULACIÓN: Pellets y Bloques de Parafina de 5 y 20 gramos.

PRESENTACIÓN: Caja de 6 pots x 1 kilo / Balde de 10 kilos.

DOSIS: En Rata (5 gr) 8 a 32 bloques / (20 gr) 2 a 8 bloques.
En Ratón (5 gr) 2 a 4 bloques / (20 gr) 1 bloque

Acción monodósica. Excelente palatabilidad.

Ketran®



COMPOSICIÓN: Bromadiolone 0,005 gr.

FORMULACIÓN: Granos de trigo aromatizado.

PRESENTACIÓN: Bolsa: 5 kg y 25 kg.

DOSIS: En Rata: 100 a 400 gr cada 5 – 10 metros
En Ratón: 7 a 14 gr cada 2 – 4 metros

Acción monodósica. Excelente palatabilidad.

Sentinel Pro®

- Para ratones e insectos rastreros.
- Lista para usar de modo túnel o plano.
- Libre de tóxicos.
- Adhesivo formulado con polímeros, resinas y aceites minerales.



Sentinel Rodent®

- Para ratas, ratones e insectos rastreros.
- Con aroma atrayente muy efectivo.
- Libre de tóxicos.
- No se seca ni chorrea.
- De larga duración.



**TRAMPA DE
PEGAMENTO**



EXCLUSIÓN

Roban Barrier®

PASTA SELLADORA

- No tóxica, con fragmentos de metal.
- Sella o rellena hasta 2 cm.
- Endurece sin perder elasticidad. Puede pintarse.
- Para interior y exterior. Tolera temperaturas extremas.



PRESENTACIÓN: Tubo x 340 gr (caja x 12 unid.)

EXCLUSIÓN

Roban Blocker®

FIBRA SINTÉTICA

- Gran durabilidad.
- Tejida con hilos gruesos de acero inoxidable.
- Para interior y exterior. Tolera temperaturas extremas.
- Esponjosa y flexible. Para rellenar huecos fácilmente.



PRESENTACIÓN: Rollo de 3 mts de largo x 10 cm de ancho
(caja x 5 unid.)

EXCLUSIÓN

Roban Guard®



BURLETE DE GOMA CON MALLA DE ACERO

- De caucho flexible con malla interna de acero inoxidable.
- Resistente y versátil.
- Soporta condiciones de acidez elevadas.
- Ideal para sellar aberturas contra insectos y roedores.

PRESENTACIÓN: Rollo de 11,9 mts de largo x 7,6 cm de ancho
(caja x unidad)

Granos Almacenados

Oxibiol®

**INSECTICIDA
GORGOJICIDA**



COMPOSICIÓN:

Deltametrina 2,5 % - Butóxido de Piperonilo 20 %.

FORMULACIÓN: Concentrado Emulsionable.

PRESENTACIÓN: Envase: Bidón 20 litros.

DOSIS: 8 cm³ / Tn Cubre 3 meses.

12 cm³ / Tn Cubre 6 meses.

20 cm³ / Tn Cubre 12 meses.



FEROMONAS

Storgard IMM+4

PARA POLILLA DE LA FRUTA SECA



COMPOSICIÓN:

Feromona de Monitoreo y Control.

FORMULACIÓN:

Dispositivo de liberación controlada.

PRESENTACIÓN:

3 unid. de cebado (trampa + feromona), 3 trampas de repuesto.

DOSIS: 1 trampa cada 16 / 20 mt lineales. Colocarlas entre 1.5 y 3 mt de altura.



FEROMONAS

Storgard CFB-RFB

**PARA TRIBOLIO CONFUSO Y
ESCARABAJO ROJO DE LA HARINA**



COMPOSICIÓN:

Feromona de Monitoreo y Control.

FORMULACIÓN:

Dispositivo de liberación controlada.

PRESENTACIÓN:

5 unidades de cebado (trampa + feromona).

DOSIS: 1 trampa cada 10 / 15 mt lineales. Reponer cada 6 semanas.



FEROMONAS

Storgard CB

PARA CARCOMA DEL TABACO

COMPOSICIÓN:

Feromona de Monitoreo y Control.

FORMULACIÓN:

Dispositivo de liberación controlada.

PRESENTACIÓN:

5 unidades de cebado (trampa + feromona + kairomona).

DOSIS: 1 trampa cada 10 / 15 mt lineales. Reponer cada 6 semanas.



FEROMONAS

Storgard KB-WB



**PARA GORGOJO KHAPA Y GORGOJO
DE PRODUCTOS ALMACENADOS**

COMPOSICIÓN:

Feromona de Monitoreo y Control.

FORMULACIÓN:

Dispositivo de liberación controlada.

PRESENTACIÓN:

5 unidades de cebado (trampa + feromona).

DOSIS: 1 trampa cada 10 / 15 mt lineales. Reponer cada 6 semanas.



FEROMONAS

Cidetrak

PARA POLILLA DE LA FRUTA SECA



COMPOSICIÓN:

Feromona para Confusión Sexual.



FORMULACIÓN:

Dispositivo de liberación controlada.

PRESENTACIÓN:

Caja con 36 dispensers.

DOSIS: 1 trampa cada 100 a 300 m³. Reponer cada 130 / 150 días.

Accesorios

TRAMPA PARA MOSQUITOS

BG-Protector®

RESISTENTE PARA USO EXTERIOR

Ideal para captura masiva de diversas especies.

Con atrayente símil olor humano.

Succión mediante ventilador blindado.
Tolera lluvias.

Puede usarse incorporando CO₂ como atractivo.

Requiere energía eléctrica con transformador de 12 volts o batería.



TRAMPA PARA MOSQUITOS

BG-GAT®

DE USO SIMPLE PARA INTERIOR O EXTERIOR

Solo requiere ensamblaje y agregado de agua.

Muy útil para monitoreo y control de hembras grávidas de *Aedes aegypti*.

Captura mediante placas plásticas adhesivas que se cambian.

No necesita energía.

Adecuada para todo tipo de uso, doméstico, profesional o científico.



TRAMPA PARA MOSQUITOS

BG-Sentinel®

PARA USO EN EXTERIOR

Puede usarse en el suelo o colgada,
plegable y autoarmable.

Con atrayente símil olor humano.

Puede usarse incorporando CO₂
como atractivo.

Requiere energía eléctrica con
transformador de 12 volts o batería.

**IDEAL PARA
INVESTIGADORES**



TRAMPA DE LUZ



Bugster 15[®]

COBERTURA: 55 m²

FUENTE LUMÍNICA: Lámpara UV-A 1 x 15 W.

MÉTODO DE CONTROL: ½ Trampa A-78 (placa adhesiva).

TRAMPA DE LUZ



Bugster 30[®]

COBERTURA: 110 m²

FUENTE LUMÍNICA: Lámpara UV-A 2 x 15 W.

MÉTODO DE CONTROL: Trampa A-78 (placa adhesiva).

TRAMPA DE LUZ



Bugster 60[®]

COBERTURA: 220 m²

FUENTE LUMÍNICA: Lámpara UV-A 4 x 15 W.

MÉTODO DE CONTROL: Trampa A-117 (placa adhesiva).

TRAMPA DE LUZ



Bugster Cenith®

COBERTURA: 55 m²

FUENTE LUMÍNICA: Lámpara UV-A 1 x 15 W.

MÉTODO DE CONTROL: 1/2 Trampa A-78 (placa adhesiva).

PLACAS ADHESIVAS

Chroma Traps®



CLASIFICACIÓN: A-78. Trampa de goma ecológica, para equipos de Luz UV.

ACCIÓN: Físico-Mecánica (sin insecticidas), captura viva.

PRESENTACIÓN: Placas de 41,8 x 23 cm. Cajas con 15, 75 ó 125 placas.

Trampa sin atrayentes, no contiene aromas ni feromonas, con un adhesivo de alto nivel de captura.

Ideal para programas MIP, permite reducir poblaciones de moscas adultas y monitorear los niveles de densidad poblacional.



Líderes en soluciones sustentables
para la Sanidad Ambiental y el
cuidado humano



Informes:

infos@chemotecnica.com

Tel.: (011) 7090-4700 / 0800-362-0500

SEGUINOS



chemotecnica_ambiental



chemotecnica.saludambiental



@chemotecnica

www.chemotecnica.com